

# 藥品使用指導單

## 福流持續釋放錠 (Forflow® 400 mg)

### ■ 藥品成分名

Pentoxifylline

### ■ 藥品外觀

白色橢圓形；標記：[L0 09]

### ■ 作用

末梢血管循環障礙

### ■ 用法

通常成人劑量為每日三次，每次一錠(與食物併服)，依個別狀況調整劑量。

### ■ 注意事項

- 對pentoxifylline和其類似物成分過敏者(如：caffeine, theophylline等)、視網膜出血、急性心肌梗塞者或懷孕中婦女，禁止使用本品。
- 若為哺乳中之婦女因病情需要而服用本品，請暫時停止哺乳。
- 因本品為持續釋放之劑型，故建議整粒吞服不要剝碎或磨粉服用。
- 若您有肝/腎功能不全的問題，或是有在同時服用warfarin藥物，請事先告知醫師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



## ■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：  
噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈、皮膚潮紅。
- 其他不常見不良反應包括：  
搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫、心跳加快或低血壓。
- 如果開始服用福流持續釋放膜衣錠後出現任何讓您困擾的症狀，請停藥並立刻與您的醫療人員聯絡。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0192

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮