

藥品使用指導單

柔沛®膜衣錠 (Propecia® 1 mg)

■ 藥品成分名

Finasteride

■ 藥品外觀

淺紅色，八邊形，膜衣錠；標記：[PROPECIA]

■ 作用

適用於治療男性的雄性禿之增髮劑、良性攝護腺肥大

■ 用法

- 建議為每天一次，每次服用一顆。
- 本藥可與食物併服或空腹服用，建議空腹服用效果較好（飯前1小時或飯後2小時）。

■ 注意事項

- 對本品成分過敏者，請勿使用此藥。
- 女性(包含懷孕或計畫懷孕、哺乳者)不適用本藥品。
- 若您本身有肝臟疾病，請事先告知您的醫師。
- 已經懷孕或可能懷孕的婦女不應碰觸壓碎或破損的PROPECIA錠劑，因為可能會吸收藥品，而對男性胎兒造成潛在危險性；若不甚碰觸到藥品請盡速以清水和肥皂洗淨接觸部位。
- 本藥品可能會影響您的前列腺專一性抗原(PSA)數值，請事先告知醫師您正在服用本藥品供醫師評估。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 以下為列舉之副作用，不一定每個人都會遇到，請勿過度驚慌：
胸部觸痛及脹大、過敏性反應(包括皮疹、搔癢、蕁麻疹、及唇部與臉部腫脹)、睪丸疼痛、性慾減低、射精障礙等。
- 若上述症狀持續且加重，請聯絡您的醫師就診處理！

■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.08
- PFS-7200-0193

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮