

藥品使用指導單

銳克鈣[®]錠 (Regpara[®] 25 mg)

■ 藥品成分名

Cinacalcet

■ 藥品外觀

淡綠色，圓扁形錠劑；大小：0.8公分；標記：[KR；02]

■ 作用

治療次發性副甲狀腺機能亢進

■ 用法

- 劑量需依個人化調整，藥品須整粒吞服，不可切割。
- 每日服用一次，建議劑量範圍為25mg~100mg，劑量調升至少需間隔2-4周。
- 本藥建議於飯後或隨餐服用。

■ 注意事項

- 對本品所含任何成份過敏者不建議使用。
- 肝功能不全、心衰竭、心律不整、癲癇病史之患者，服用本藥前請事先告知您的醫(藥)師。
- 若有在服用抗心律不整、抗黴菌或抗憂鬱劑等藥品，請事先告知醫師。
- 因潛在風險目前為未知，懷孕或授乳婦女不建議使用本藥品。
- 服用本藥品需定期回診追蹤血鈣、血磷等檢驗數值，以利作劑量調整與監測療效；由於本藥品會降低血鈣值，若出現疑似低血鈣之症狀(例：皮膚感覺異常、肌痛、抽筋、抽搐等)，請盡速您的醫療人員。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 不是每一個人都會出現以下列舉之副作用，請勿過度驚慌：過敏反應、腹瀉、噁心、嘔吐、食慾缺乏、焦慮、肌肉痙攣、頭痛、心悸等。
- 如果服藥後出現任何讓您困擾的症狀，請先停用並提早回診告知醫師。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.08
- PFS-7200-0194

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

