

# 藥品使用指導單

## 銳虎<sup>®</sup>持續性藥效錠 (Rinvoq<sup>®</sup> ER 15 mg)

### ■ 藥品成分名

Upadacitinib Hemihydrate

### ■ 藥品外觀

紫色、雙凸面橢圓形，標記：[a15]

### ■ 作用

治療類風溼性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎或異位性皮膚炎

### ■ 用法

- 劑量因人而異，請按醫師指示，每日盡量固定同一時間服用。
- 通常建議劑量為每日15 mg，異位性皮膚炎患者視情況增加至每日30 mg。
- 可於飯前或是飯後服用，須整粒吞服不應剝半或咀嚼、攪碎。

### ■ 注意事項

- 若您有肝、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 因本藥可能會對胚胎造成傷害，故具生育能力之女性於本藥治療期間以及最後一劑藥物後四周需使用有效之避孕措施。
- 此藥物會分泌至母乳中，有哺乳需求的婦女，應先告知您的醫生及藥師，治療前後六天內不宜哺乳。
- 本品治療期間須留意有無感染症狀，若您本身為免疫力低下之患者，請事先告知您的醫師並做評估。
- 本品治療期間不建議接種活性減毒疫苗。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 較常見：肌肉痛、噁心、咳嗽、感冒症狀、發燒、體重增加、痤瘡等，若發生後無法忍受或症狀加劇，請回診告知醫師進行調整。
- 可能發生罕見但嚴重之皮膚不良反應，如有血便、深色尿、蕁麻疹、胸痛、呼吸困難、嚴重頭痛等應立即就醫。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.08
- PFS-7200-0195

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮