

藥品使用指導單

瑞肺得®膜衣錠 (Revatio® 20 mg)

■ 藥品成分名

Sildenafil

■ 藥品外觀

白色，圓形膜衣錠；標記：[RVT 20][pfizer]

■ 作用

治療成人肺動脈高壓，以改善日常活動能力

■ 用法

- 建議劑量為口服20 mg，一天三次。兩劑之間應間隔4-6小時服用。
- 劑量因個人情況而異，請遵照醫師指示服用。

■ 注意事項

- 已知對本藥品成分或其賦形劑過敏者請勿服用。
- 若您本身有在服用有機硝酸鹽(本院品項：易適倍®錠、冠欣®膜衣錠、耐絞寧®錠)、威而鋼® (Viagra®)、或 riociguat (本院品項：Adempas愛錠保肺錠)，禁止與本藥品一起併服。
- 若您同時有在服用其他降血壓藥物(例：amlodipine, alfuzosin, doxazosin, prazosin, silodosin, tamsulosin, terazosin)、rifampin、erythromycin、抗黴菌藥物(例：ketoconazole, itraconazole)等，請事先告知您的醫(藥)師。
- 有肝、心血管疾病、孕婦或哺乳者，服用本品前請先告知醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 不是每一個人都會有以下列舉之副作用，請勿過度驚慌：紅疹、頭痛、流鼻水、流鼻血、四肢潮紅、陰莖異常勃起、視力減退、聽覺喪失、耳鳴、頭暈、呼吸困難、胸痛等。
- 若上述症狀持續且加重時，請盡速就醫或告知您的醫師！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處（30℃以下）、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.08
- PFS-7200-0196

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮