

藥品使用指導單

律諾®膜衣錠 (Rhynorm® 150 mg)

■ 藥品成分名

Propafenone

■ 藥品外觀

白色錠劑；標記：[R]

■ 作用

治療、預防心律不整

■ 用法

- 劑量可能隨個別狀況有差異，請遵照醫師指示服藥。
- 建議於飯後搭配適量開水服用(勿咀嚼)。

■ 注意事項

- 服用本品請整粒吞服勿咀嚼，因為可能會有苦味及表面麻醉的作用。
- 曾對本藥或類似藥物過敏者、嚴重阻塞性肺部疾病及特定病況未放心臟節律器患者，禁止服用本藥。
- 孕婦、授乳婦女、重症肌無力患者服用本藥前請事先告知醫師。
- 若您正在服用ritonavir, digoxin, ketoconazole, warfarin及其他抗心律不整用藥，請主動告知您的醫師。
- 服用本品請盡量不要服用葡萄柚(汁)。
- 此藥極少數可能會造成白血球數量減少，進而增加感染風險，若您出現發燒、畏寒、喉嚨痛等症狀請盡速聯絡您的醫師。
- 本品治療期間請定期回診追蹤心電圖變化。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
- 絕不可一次服用雙倍劑量。

■ 可能的副作用

- 以下列舉之副作用不是每個人都會發生，請勿過度驚慌：頭暈、頭痛、心悸、焦慮、呼吸困難、腹痛、嘔吐、腹瀉、肝功能異常、低血壓、白血球減少、陽萎等。
- 若上述症狀持續且加劇，請盡速聯絡您的醫(藥)師以利評估！

■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.08
- PFS-7200-0197

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

