

藥品使用指導單

力必平[®]錠 (Requip[®] 0.25, 1 mg)

力必平[®]持續性藥效錠 (Requip[®] PD 2mg)

■ 藥品成分名

Ropirinole

■ 藥品外觀

Requip 0.25 mg：白色，五邊形錠劑；標記：[SB][4890]

Requip 1 mg：淺灰黃綠，五邊形錠劑；標記：[SB][4892]

Requip PD 2 mg：粉紅色，長橢圓形錠劑；標記：[GS][3V2]

■ 作用

巴金森氏症、不寧腿症候群

■ 用法

- 空腹或與食物併服均可。
- 用於不寧腿症候群時，可於睡前3小時內服用。
- 用於巴金森氏症時：可根據個人病況逐漸調高劑量，一天三次，最多增至24 mg/天。
- 持續性藥效錠(Requip[®] PD 2 mg)必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割，每日服用一次。

■ 注意事項

- 服用本藥可能造成困倦嗜睡，駕車或操作器械應謹慎。
- 服用本藥可能造成起立型低血壓症，改變姿勢時需放慢動作。
- 若出現噁心症狀，將藥品與食物一起服用，可能有助減少腸胃不適的發生。
- 服用本藥可能會產生幻覺，而且老年病患的危險性較高。
- 嚴重心血管疾病、肝腎功能不全患者、孕婦或哺乳婦女請主動告知醫師。
- 若有服用多巴胺拮抗劑(例如抗精神疾病藥物或metoclopramide)、成藥、保健食品、中草藥等，請先告知醫師。
- Requip[®] PD 2 mg 持續釋放劑錠可能會因個人腸胃道蠕動速度較快，而在糞便中看到剩餘藥物或藥物釋放不完全。
- 欲停用本藥時建議以逐漸減量的方式停藥，不建議突然停用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：噁心、便秘、頭暈、頭痛、嗜睡、姿勢性低血壓、運動障礙、食慾增加、周邊性水腫。
- 若出現日間嚴重瞌睡或於須主動參與的活動(如對話、飲食等)中睡著，請先停藥並盡速回診告知醫師。
- 如果開始服藥後出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30℃以下)。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.08
- PFS-7200-0198

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮