

藥品使用指導單

樂肺寧®糖衣錠 (Rifinah® 300, 150 mg)

■ 藥品成分名

Rifampicin, Isoniazid

■ 藥品外觀

Rifinah® 150 (RIF 150 mg, INH 100 mg)：明紅紫色，圓形錠劑

Rifinah® 300 (RIF 300 mg, INH 150mg)：鮮橙色，長圓柱形錠劑

■ 作用

- 治療結核病

■ 用法

- 本品常用劑量需依**體重**給予
 - 少於50公斤：每天一次服用3錠 Rifinah® 150 (圓紫色)
 - 50公斤(含)以上：每天一次服用2錠 Rifinah® 300 (長橢橘色)
- 樂肺寧®錠應於餐前至少30分鐘或餐後2小時服用。
- 劑量可能因人而異，請遵照醫囑使用。

■ 注意事項

- 若對本品賦形劑或本品之任一成份過敏，請勿使用此藥。
- 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝、腎臟病及正服用其他藥物者，請先告知醫師。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
- 若您本身有在服用制酸劑(本院品項：MgO 氧化鎂、氫氧化鋁錠、Gaining 胃鈣寧、Strocain 息痛佳音錠、Tido 第得錠等)，請與本藥間隔至少1小時服用。
- 服用本品期間請避免大量食用富含酪胺(tyramine)的食物，例：乳酪、紅酒、動物肝臟、酪梨、蠶豆等，以避免導致血壓升高。
- 若服用藥物後出現疑似肝炎之症狀(例：疲憊、虛弱、厭食、噁心或嘔吐等)，請盡速聯絡您的醫師做後續評估。
- 本品可能會造成您的體液呈橘紅色，此為正常現象請勿過度驚慌。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 以下列舉之副作用並不是每一個人皆會發生，請勿過度驚慌：腹瀉、嘔吐、過敏反應(紅疹、搔癢、水腫、呼吸困難等)、視力模糊、發燒、喉嚨痛、寒顫、關節痛、四肢麻木疼痛、虛弱等。
- 若上述症狀持續且加重時，請盡速聯絡醫療人員或就醫評估！

■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.08
- PFS-7200-0199

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

