

藥品使用指導單

樂衛瑪[®] 膠囊(Lenvima[®])

■ 藥品成分名

Lenvatinib

■ 藥品外觀

10mg – 黃色/黃紅色硬膠囊，標記特殊：符號| LENV 10 mg

4mg – 橘紅色膠囊，標記特殊：符號| LENV 4 mg

■ 作用

樂衛瑪[®]是一種多重激酶抑制劑，可抑制血管內皮生長因子受體、纖維母細胞生長因子受體、RET、KIT 和血小板衍生生長因子受體之激酶活性，以此抑制腫瘤生長及血管新生。

■ 用法

一天一次，可隨餐或空腹使用。

■ 注意事項

1. 請整粒吞服，勿咬碎。
 - ◆ 若無法吞服，可將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，靜置至少10分鐘，再攪拌至少3分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用完水或蘋果汁。
2. 有生育能力的婦女於樂衛瑪[®]治療期間及服用最後一個劑量後至少30天應採取有效之避孕措施。
3. 如需進行手術或其他侵入性治療，請告知醫師或藥師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 如果忘記服藥並且未能在12小時內服用，應略過該次劑量並且於原定服藥時間投予下一次劑量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 常見：高血壓、手足症候群、腹瀉、疲累、蛋白尿

手足症候群

- ◆ 常見症狀：腳趾、腳跟、關節等承受壓力處出現紅、痛感、水腫，進而出現硬皮(角質化反應)，嚴重可能出現水泡。
- ◆ 發生時間：較常發生在開始治療的2至6周
- ◆ 當手足症候群出現時，你**須避免**：
 - 弄破水泡(應用凡士林塗抹，並蓋上紗布或OK繃)
 - 洗熱水澡、將手腳泡在熱水中、或泡溫泉等。
 - 從事任何可能會讓手掌腳掌施壓的動作，如劇烈運動、長時間走路、大掃除或園藝活動等。
- ◆ 當手足症候群出現時，你**可以**：
 - 使用溫水洗手，並以輕拍方式擦乾避免摩擦
 - 穿著寬鬆柔軟的衣服及鞋子
 - 穿著厚襪子以保護腳
 - 勤擦尿素軟膏或維生素ADE潤膚霜。
 - 醫生可能會視情況開止痛藥物或類固醇藥膏給您

- 罕見但嚴重：胃腸道穿孔、心臟功能異常、肝毒性

■ 如發生以下情形，請盡速回院就診

- 發燒
- 出血
- 胸悶、呼吸困難、心跳異常
- 嚴重腹痛
- 傷口紅腫範圍擴大或出現膿液
- 尿液呈茶色，伴隨皮膚變黃

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/ 112.02

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮