

# 藥品使用指導單

## Molnupiravir 莫納皮拉韋

(COVID-19口服抗病毒藥物)

### ■ 藥品成分名

Molnupiravir 200 mg/膠囊

### ■ 藥品外觀

橘色不透明膠囊；標記：[82]

### ■ 適應症

- Molnupiravir為專案核准輸入緊急使用授權(EUA)藥品，適用於治療具有重症風險因子(懷孕不適用)，未使用氧氣且於發病5天內之 $\geq 18$ 歲之輕度至中度COVID-19確診病人，且無法使用其他建議藥物者。

### ■ 用法用量

- 每12小時服用4顆molnupiravir膠囊(如:上午8點和晚上8點，各4顆)
- 連續服用5天，未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
- 可隨食物或不隨食物服用molnupiravir。
- Molnupiravir膠囊應整顆吞服，切勿打開、破壞或壓碎膠囊。
- 若無法吞服整顆膠囊，請告知醫療照護人員，可考慮利用口服懸液劑方式服用，以下為臨床試驗(MOVE-IN/MK-4482-001)中利用鼻胃管/口胃管投予molnupiravir的藥物配置方法：

免責聲明：利用口服懸液劑方式給予病人molnupiravir的效用並未在臨床試驗中評估，原始試驗中的投予方式為每12小時口服一次。根據第二期臨床試驗(MOVE-IN/MK-4482-001)的資料，僅有5位受試者利用鼻胃管/口胃管投予molnupiravir，且molnupiravir中文說明書中並不推薦該方式給予藥物。

**1** 打開四顆膠囊並將內容物置於調製杯器或注射器中

**2** 加入40 毫升的水

**3** 將膠囊內容物與水均勻混合/攪拌3分鐘  
配置完畢請盡快投予病人服用  
· 根據此份手冊配置的重組懸液劑可能含有肉眼可見的未溶解懸浮物質，仍可作為口服使用

**注意事項**

- 建議應在懸液劑配置完成後，最晚一小時內盡快給予病人
- 若非配置完畢立即投予，給予前須重新均勻混和口服懸液劑一分鐘
- 可額外再給予水分確保所有藥物吞嚥完成，水量上限為240毫升

上圖截自衛生福利部疾病管制署Molnupiravir無法口服且有用藥需求之病患之口服懸浮液配置建議 (<https://www.cdc.gov.tw/File/Get/SGDk6KWHJi2R-iJu2lnDoQ>)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢醫師或藥師



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

# 藥品使用指導單

## Molnupiravir 莫納皮拉韋

(COVID-19口服抗病毒藥物)

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果在**10小時**內想起，可盡快補服。
- 如果超過10小時，請等到下一次服藥時間再使用。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### ■ 副作用

- 常見副作用：腹瀉、噁心、暈眩、頭痛等。
- 如果您發生任何對您造成困擾或持續未緩解的副作用，請聯繫您的醫療照護人員。

### ■ 注意事項：

- 建議具生育能力者於藥物服用期間至結束後數天應**避孕**：女性持續**4天**，男性持續至少**3個月**。
- 建議使用molnupiravir治療期間和使用最後一劑molnupiravir後4天內**不建議餵哺母乳**。
- 專案核予EUA以提供病人使用，故因使用此藥物後發生不良反應導致死亡、障礙或嚴重疾病時，不適用藥害救濟。

### ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處，避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

1. 默沙東Molnupiravir中文說明書(1110504版)
2. 公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案\_1110616第6次修訂

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.11
- PFS-7200-0202

衛教單滿意度調查



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢醫師或藥師



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮