


藥品使用指導單

抗血小板藥物

■ 本院品項

商品名	成份	外觀	用法
Bokey 伯基	Aspirin		一天一次 一次一顆
Clopidogrel 可諾通	Clopidogrel		一天一次 一次一顆
Plavix 保栓通	Clopidogrel		一天一次 一次一顆
Brilinta 百無凝	Ticagrelor		一天兩次 一次一顆
Licodin 利血達	Ticlopidine		一天兩次 一次一顆
Efient 抑凝安	Prasugrel		一天一次 一次一顆

■ 使用目的

抑制血小板凝集作用、防止血栓的形成，降低心肌梗塞再次發生的機率。

■ 副作用

1. 抗血小板藥物可能增加出血的風險，例如皮膚瘀青或點狀出血、血便或黑便。若在服藥期間有發生出血的副作用，務必告知您的主治醫師，由醫師判斷是否可以停用。
2. 百無凝可能造成些微呼吸不順暢，若有發生此情形，請回診告知主治醫師協助評估您的狀況。

■ 注意事項

1. 未和醫師討論前，切勿自行停用藥物！
2. 若需進行外科手術或侵入性牙科治療(例如拔牙、植牙)時，應主動告知手術醫師您正在服用此類藥品，評估手術的必要性與停用抗血小板藥物的時機。
3. 服用抗血小板藥物期間，請避免飲酒、食用文旦、葡萄柚、楊桃，或是自行服用止痛藥，這些都可能影響藥物治療效果。

諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部林奕瑱藥師/112.02

PFS-7200-0204

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮