

藥品使用指導單

羅可坦®膠囊 (Roaccutane® 20mg)

■ 藥品成分名

Isotretinoin

■ 藥品外觀

濁紅紫/白色，長圓柱形軟膠囊；大小：1.30公分；標記：[ROA，20]

■ 作用

用於傳統療法無效之嚴重痤瘡。

■ 用法

此藥需與食物併用，劑量因人而異，每日一至二次，請依醫師指示服用。

■ 注意事項

- 若您對此類藥物或大豆過敏，請提前告知您的醫（藥）師。
- 若您有服用以下藥物，如：四環素類 (doxycycline, minocycline, tetracycline)、維生素A、避孕藥等，請告知您的醫（藥）師。
- 本品初始治療期間，偶爾會出現痤瘡急性惡化的現象，但通常可於7-10天之內完全消退，且通常不需因此而調整劑量。
- 服藥期間請避免曝曬於強烈日光或紫外線，並做好防曬措施。
- 本藥禁用於懷孕或哺乳之婦女，因為本藥可能會傷害胎兒，若您計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，服用本品前、治療期間、後一個月皆須做好避孕措施。
- 羅可坦®治療期間及停藥後一個月內應避免捐血，以免使接受輸血之孕婦的胎兒意外接觸此藥物，增加其致畸胎風險。
- 羅可坦®治療期間可能會有視力減弱或眼睛乾澀的情形，夜間駕駛或操作機械請多加留意，若情況日趨嚴重請盡速告知醫療人員。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見：皮膚乾燥、粘膜乾燥如嘴唇、口唇炎、鼻粘膜(流鼻血)、咽部(聲啞)、眼睛(結膜炎、可逆性的角膜混濁和無法使用隱形眼鏡)等，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。
- 若有下述症狀，請立刻通知您的醫師：嚴重皮膚過敏反應、血尿、嚴重腹瀉等。

■ 保存方法

- 此藥請於室溫儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限欲丟棄時，不可直接經由家庭廢棄物處理，請將任何未使用的羅可坦[®]膠囊歸交至醫療院所做特殊廢棄處理。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.11
- PFS-7200-0205

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

