

藥品使用指導單

納霍利®膜衣錠 (Notholic® 50mg)

■ 藥品成分名

Naltrexone Hydrochloride

■ 藥品外觀

黃色橢圓形膜衣錠

■ 作用

用於鴉片、酒精依賴之戒斷。

■ 用法

此藥之治療劑量因人而異，請依醫師指示服用。

■ 注意事項

- 若您對此類藥物過敏或為肝臟衰竭之病人，請提前告知您的醫（藥）師。
- 若您正在服用類鴉片止痛劑，或因有類鴉片依賴性而正在接受methadone或buprenorphine治療者，禁止使用本品。
- 若您為懷孕或哺乳之婦女，請先告知您的醫師並做進一步的諮詢。
- 服用本品可能會出現嗜睡或暈眩的情形，若欲操作危險機械或駕駛須特別留意。
- 服用本品期間，若您同時有使用部分感冒止咳製劑、止瀉劑及類鴉片止痛劑等，可能會讓前述藥品藥效降低。
- 本品建議與類鴉片製劑至少間隔7-10天，以降低戒斷症狀發生之風險。
- 納霍利®膜衣錠為純類鴉片拮抗劑，不會引起生理或心理的依賴性。
- 服用本品後，若開始出現憂鬱或自殺的想法，請盡速告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見：入睡困難、焦慮、神經質、腹痛/絞痛、噁心/嘔吐、無力、關節肌肉痛和頭痛等，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。
- 若有下述症狀，請立刻通知您的醫師：嚴重過敏反應、自殺意圖、深色尿液等。

■ 保存方法

- 此藥請於室溫儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.11
- PFS-7200-0206

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

