

藥品使用指導單

移護寧[®]錠 (Imuran[®] 50 mg)

■ 藥品成分名

Azathioprine

■ 藥品外觀

淡黃色，圓扁形錠劑；標記：[IM/5]

■ 作用

調節免疫功能。

■ 用法

請按照醫師的指示服用，建議於飯前、喝牛奶前至少 1 小時，或進食、喝牛奶後 3 小時以上再使用。

■ 注意事項

- 若您對此藥或 6-mercaptopurine 過敏，請告知醫師。
- 若您有在服用降尿酸製劑 (allopurinol, febuxostat)、胺基水楊酸衍生物 (mesalamine, olsalazine, sulphasalazine) 等，請事先告知醫師，併服可能會需要減低移護寧[®]的劑量。
- 若您有在服用抗凝血劑 (warfarin)，請事先告知醫師，並定期回診監測凝血功能。
- 若您為孕婦，請事先告知醫師，非必要情形之下，不建議使用本藥品。
- 哺乳婦女服用本品期間不建議授乳。
- 若您有貧血、肝、腎方面的疾病，請先告知醫師。
- 有嚴重感染症者須慎重投與，用藥前請先諮詢您的醫師。
- 如果需要接種疫苗，請先諮詢您的醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：潰瘍性口炎、噁心、腹部不適、冷顫、發燒、關節疼痛。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較罕見的副作用：呼吸困難、胸痛、皮膚出現潰瘍、皮疹、異常出血或瘀青，請立即就醫並告知您的醫師！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.12
- PFS-7200-0207

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

