

藥品使用指導單

必賴克瘦[®]膜衣錠 (Plaquenil[®] 200 mg)

■ 藥品成分名

Hydroxychloroquine

■ 藥品外觀

白色，圓扁形錠劑；大小：1.0公分；標記：[HCQ][200]

■ 作用

調節免疫功能。

■ 用法

劑量因人而異，請按照醫師的指示服用，建議服藥時隨餐點或和牛奶併用。

■ 注意事項

- 若您對此藥過敏或本身有視網膜病變者，請先告知醫師。
- 服用本藥前和治療期間，建議定期至眼科追蹤檢查。
- 若您本身有心律不整、肝、腎、腸胃道疾病者，請先告知醫師。
- 若您有在服用 digoxin, cimetidine, 糖尿病藥物、胰島素等，請先告知醫(藥)師。
- 若您有在服用制酸劑(本院品項: 氧化鎂 MgO、氫氧化鋁、息痛佳音 Strocain、第得Tido、胃鈣寧 Gaining、舒胃 Swei)，請與本品間隔至少4小時服用，避免制酸劑影響本品之吸收。
- 服用本品初期可能會有視覺模糊或畏光的情形，這些大多為可逆且暫時性的，但若症狀惡化或影響日常生活時，請盡快聯絡您的醫療人員。
- 孕婦婦女不建議使用本藥品。
- 哺乳婦女服用本品期間不建議授乳。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：視覺模糊、腹部不適、頭暈、冷顫、發燒、關節疼痛。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較罕見的副作用：呼吸困難、胸痛、皮膚出現潰瘍、皮疹、深色尿液、心律不整、視力嚴重異常，請立即就醫並告知您的醫師！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 111.12
- PFS-7200-0208

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮