

藥品使用指導單

適撲諾®膠囊 (Sporanox® 100mg)

■ 藥品成分名

Itraconazole

■ 藥品外觀

淡藍色，明紅紫色膠囊

■ 作用

治療黴菌感染。

■ 用法

此藥需飯後服用以達最佳吸收效果，劑量因人而異，請依醫師指示服用。

■ 注意事項

- 若您已知對此藥物過敏，請提前告知您的醫（藥）師。
- 若您有服用以下藥物，如：dronedarone, eplerenone, felodipine, ivabradine, lurasidone, quinidine, ranolazine, ticagrelor, lovastatin, simvastatin, 麥角生物鹼, terfenadine等，請告知您的醫（藥）師。
- 本藥會與多項藥物有交互作用，請告知您所有的用藥給醫療人員知悉。
- 若您有心、肝、腎、肺部疾病者，請告知醫師。
- 本品建議與制酸劑、降低胃酸之藥物間隔至少2小時。
- 懷孕婦女不建議使用本品，因為本藥可能會傷害胎兒，若您計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，服藥期間須做好避孕措施。
- 服用本品可能會有視力模糊或頭暈的情形，操作危險機械或駕駛時請多加留意，若情況加劇請盡速聯絡您的醫療人員。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見：暈眩、視力模糊、腹瀉、頭痛等，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。
- 若有下述症狀，請立刻通知您的醫師：嚴重皮膚過敏反應、深色尿、心律不整、水腫等。

■ 保存方法

- 此藥請於室溫儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.12
- PFS-7200-0209

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

