

藥品使用指導單

貝樂克®膜衣錠 (Baraclude® 0.5mg、1mg)

■ 藥品成分名

Entecavir

■ 藥品外觀

0.5mg：灰白色，三角形，膜衣錠；標記：[BMS][1611]

1mg：粉紅色，三角形，膜衣錠；標記：[BMS][1612]

■ 作用

治療B型肝炎。

■ 用法

此藥品必須空腹服用(飯前至少2小時及飯後至少2小時)。

未經醫師同意，切勿自行停藥或改變劑量。

■ 注意事項

- 若您已知對此藥物過敏，請提前告知您的醫（藥）師。
- 若您有腎功能不全等疾病，請告知醫師。
- 若您計畫懷孕，或在服藥期間已懷孕，或正在哺乳，請告知醫師。
- 在停止治療後應定期回診至少數個月，以追蹤肝炎是否惡化。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見：噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、疲倦等，若發生後無法忍受，請回診告知醫師。

■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/112.05
- PFS-7200-0211

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

