

藥品使用指導單

易復癆[®]錠 (Epbuto[®]l 400mg)

■ 藥品成分名

Ethambutol

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：1.3公分；標記：[YS/EB]

■ 作用

治療結核病。

■ 用法

每日一次，於固定時間服用。

未經醫師同意，切勿自行停藥或改變劑量。

■ 注意事項

- 若您已知對此藥物過敏，請提前告知您的醫（藥）師。
- 飯前或飯後服用，對藥效無影響，但若您易有胃腸不適的可能性，可隨餐服用，以減緩不適症狀。
- 若需服用制酸劑，建議與本品間隔至少2小時。
- 若您過去曾有痛風、肝、腎疾病者，請告知醫師。
- 若您計畫懷孕，或在服藥期間已懷孕，或正在哺乳，請告知醫師。
- 對於糖尿病、酒精中毒、已有視覺障礙產生之患者，不宜使用本劑。
- 服藥期間請避免飲酒。
- 服藥期間請定期回診並視情況做視力、肝功能、腎功能和血液學檢查。
- 服藥期間若有視力變化請立即回診告知醫生。
- 服用本品可能會有視力模糊的情形，服藥期間應避免駕駛或操作危險機械。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 若有下列現象，請立即告知醫師：手足麻痺與刺痛感、視力突然改變、視覺模糊、無法辨識紅色與綠色、皮膚紅疹、發癢、呼吸困難。
- 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師：噁心嘔吐、胃痛、頭痛、頭暈、食慾不振。

■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 112.05
- PFS-7200-0212

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮