

# 藥品使用指導單

## 異菸鹼醯肼<sup>®</sup>錠 (Isoniazide, INAH<sup>®</sup>100mg)

### ■ 藥品成分名

Isoniazid

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：0.7公分

### ■ 作用

治療結核病。

### ■ 用法

每日一次，於固定時間服用。

未經醫師同意，切勿自行停藥或改變劑量。

### ■ 注意事項

- 若您已知對此藥物過敏，請提前告知您的醫(藥)師。
- 建議空腹服用(飯前一小時或飯後二小時)，但若您有胃腸不適的症狀，可隨餐服用。
- 若需服用制酸劑，建議與本品間隔至少2小時。
- 有使用任何處方藥或非處方藥，請先告知醫(藥)師，特別是抗癲癇藥、抗黴菌藥、避孕藥、免疫抑制劑等。
- 若您有肝、腎疾病、糖尿病、長期有飲酒習慣者，請告知醫師。
- 若您計畫懷孕，或在服藥期間已懷孕，或正在哺乳，請告知醫師。
- 服藥期間請避免飲酒。
- 服藥期間應避免食用發酵或醃漬的加工品，如乳酪(起司)、優格、魚乾、香腸、培根、啤酒、紅酒等，可能會引起高血壓、頭痛、潮紅、心悸、發汗、頭昏、寒顫、腹瀉等症狀。若發生上述症狀，請立即就醫。
- 可補充維他命 B6，以減少神經炎的發生。若出現手腳刺痛或麻木感，請告知醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 若有下列現象，請立即告知醫師：噁心嘔吐、疲倦、茶色尿、皮膚或眼睛變黃、手腳刺痛或麻木感、記憶不佳、視力改變。
- 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師：腹瀉、腹痛。

## ■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/112.05
- PFS-7200-0213

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

