

藥品使用指導單張

舒肺樂®注射劑 (Nucala® 100mg/mL)

■ **成分：** Mepolizumab

■ 藥品外觀

預充填式筆型注射劑，含澄明注射液。

■ 適應症

成人嚴重氣喘


■ 用法用量

每4週一次，每次皮下注射100毫克。



■ 注射部位

- 可選擇腹部(距肚臍 5 公分之外的區域)、上臂(外側中段)或大腿(前外側上 1/3 處)的皮下。
- 每次注射部位建議輪替，避免同一個部位重複注射。



■ 保存方法

- 請冷藏於2°C至8°C的冰箱中，並保存於原始包裝盒中直到使用時再取出，以避免光線照射。
- 切勿冷凍或振搖、請遠離高溫。
- 未開封的包裝盒不可在冰箱外環境留置超過7天。
- 因無菌因素之考量，此注射器自包裝盒塑膠封膜取出之後，必須於8小時內使用。若未在8小時內使用，應將其丟棄。
- 每支注射器僅供單次使用。


此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮


■ 如何使用舒肺樂注射劑？

1. 使用前，自冰箱中取出後應等候30分鐘回溫。
2. 檢查注射筆名稱、有效期限是否有誤。
3. 檢視窗口內藥物顏色應為澄清至淡黃色，若有看到些許氣泡，此為正常現象。
4. 洗淨雙手，並用酒精棉片擦拭欲施打的部位。



步驟 1：移除透明針頭蓋

1. 拉開注射器上的透明針頭蓋。
 - 針頭末端看到一滴藥物為正常現象。
2. 移除針頭蓋之後，務必在5分鐘內注射
 - 切勿用手指按壓黃色針頭護罩。
 - 切勿再將透明針頭蓋套回到注射器上。




步驟 2：開始注射

1. 將注射器直立放注射部位上，檢視窗口請朝向自己。
2. 向下壓到底，讓注射器持續抵住皮膚。
3. 聽到第一聲「卡嗒」，表示注射已經開始。
4. 在注射藥物的同時，黃色指示器會向下移動通過檢視窗口。
 - 切勿在此步驟就將注射器提起來。
 - 如果黃色針頭護罩未向上滑入自動注射器，切勿繼續使用。



步驟 3：按住注射不放

1. 持續向下按住注射器，直到聽到第二聲「卡嗒」。
2. 聽到第二聲「卡嗒」之後，繼續按住5秒後將注射器提起來。
3. 如果沒有聽到第二聲「卡嗒」：
 - 確認檢視窗口已被黃色指示器填滿。
 - 持續向下按住15秒，以確保注射完成。



步驟 4：注射完成

使用完畢後將用過的注射器與透明針頭蓋丟棄於尖銳廢棄物容器。

■忘記使用藥品怎麼辦

- 若您忘記施打舒肺樂，想到時請儘快補打。
- 若距離下次預定給藥時間太近，或不確定是否要補打，請聯絡醫(藥)師詢問。

■可能的副作用

- 過敏反應:蕁麻疹、雙眼嘴唇面部腫脹、呼吸困難、暈眩昏厥...等等。
- 接種部位皮膚不適(發癢、疼痛、發紅)、流行性感冒、背痛、關節痛、頭痛、喉嚨痛、尿道感染、帶狀皰疹等。
- 若注射後有以上症狀發生，或加重且持續數天，請告知醫(藥)師。

■注意事項

- 若使用前藥品外觀破損或遭破壞，請勿使用。
- 若您計畫懷孕、已懷孕或正在授乳，請主動告知醫(藥)師
- 若您有服用其他藥品或保健食品，請主動告知醫(藥)師。
- 勿與其他藥品混合使用。
- 勿重複使用同一支舒肺樂注射劑。
- 舒肺樂注射劑僅供皮下注射使用。
- 若注射部位有紅腫、疼痛，應避免注射此位置。如果症狀仍持續，應告知醫(藥)師。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位 / 日期：藥劑部/111.07

PFS-7200-9003

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮