


藥品使用指導單張

善纖達®注射筆 Saxenda® 18mg/3mL/pen

■ 藥品成份名

Liraglutide



■ 藥品外觀

善纖達®為預填式注射筆，內容物為無色、澄清水狀的液體。

■ 作用

體重控制

■ 保存方法

- 未使用過的注射筆請放在冰箱中冷藏(2°C至8°C之間)，不可冷凍。
- 首次開封使用後，請將注射筆保持在低於30°C的室溫下，室溫保存期限為一個月。
- 避免注射筆於過熱和日光直射的環境，使用完應套回筆蓋。
- 請將善纖達®注射筆和針頭放在兒童接觸不到的地方。

■ 可能的副作用

- 使用善纖達®最常見的副作用是胃腸道不適，包括噁心、嘔吐、腹瀉、便秘等。
- 少數人會出現低血糖現象，尤其是第二型糖尿病病患。低血糖症狀可能包括發抖、冒冷汗，心跳加快和視力模糊等。低血糖的緊急處理方式如下：
 - 血糖值小於70 mg/dl：應立即進食含15公克易吸收含有糖份的食品，如含糖飲料或果汁150毫升、3顆方糖、2包糖包、1大匙蜂蜜、2大匙葡萄乾或葡萄糖錠3顆等。
 - 15分鐘後若症狀未改善，可再吃一次15公克易吸收含有糖份之食品（同上）；若低血糖症狀一直沒有改善，則應立刻送醫治療。
 - 如症狀改善，但距離下一餐還有一小時以上，建議喝一杯(240毫升)牛奶或食用一份點心避免再度發生低血糖。
- 其他可能的副作用可能包括注射部位不適、頭痛、呼吸困難。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.05

PFS-7200-9005


此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 如何使用善纖達®注射筆?

1. 使用前，請先檢查您的注射筆名稱及有效期限，確認您拿的是正確的注射筆。移除筆蓋，檢查您的藥液是否呈現澄清無色。
2. 以酒精棉片擦拭橡皮塞；拿取一個新的針頭，撕下保護封膜，將針頭筆直接到注射筆上並將針頭旋緊。移除針頭外蓋後，記得先保留以便後續使用；移除針頭內蓋並將其丟棄。
3. 每支新的注射筆第一次施打前應執行排除空氣：旋轉劑量設定鈕，直到排空標示線和劑量指示線對齊，將針頭朝上後按住注射鈕直到劑量顯示窗顯示“0”。若藥液順利從針頭尖端流出，代表您的注射筆可以正常使用。若沒有看到胰島素流出，可重覆前述步驟最多3次，若仍沒有藥液流出，請更換針頭並重覆測試確保注射筆和針頭運作正常。
4. 轉動劑量設定鈕直到指針對應到您所需的劑量。若轉超過您所需的劑量，可以反向旋轉回去。
5. 善纖達®可注射於您的腹部、大腿外側或上臂。以酒精棉片消毒注射部位，待酒精風乾後將針頭刺入您的皮膚，請確認您可同步查看到劑量視窗。



6. 長按注射鈕直到劑量顯示窗口出現0。您可能可以聽到或感覺到“喀”一聲。繼續壓住注射鈕並緩慢數到6，可確保您注入所有的藥量。鬆開按鈕後，將針頭拔出。
7. 注射完畢，將注射筆針套回針頭外蓋並將兩者套緊，須小心被針尖戳傷，蓋上後再反方向旋轉取下針頭。使用過的針頭應丟棄在防刺傷的容器內。
8. 將筆蓋套回注射筆。請勿在針頭未拆卸的情況下套回筆蓋。

■ 注意事項

1. 請勿重覆使用針頭。重覆使用針頭可能會造成針頭阻塞、增加注射時的疼痛感及影響注射劑量。
2. 即使針頭已經更換，也不要和他人共用您的注射筆。您可能會使他人受到嚴重感染或被他人嚴重感染。
3. 請輪替您的注射部位。若多次重覆注射同一部位，可能會造成皮膚脂肪堆積，也會影響藥物吸收速率。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮