

藥品使用指導單

使肺泰[®] 定量噴霧吸入器 Seretide[®] Evohaler

■ 藥品成分名


Fluticasone、Salmeterol

■ 作用

可減少氣管發炎並使支氣管擴張，用於治療氣喘、慢性阻塞性肺部疾病。

■ 用法

1. 將噴霧器出口 蓋子 移除



2. 將吸入器輔助器開口較寬的一邊與噴霧器 出口 連接



3. 上下搖動 噴霧器（瓶底感到冰涼即可），同時確定上述連接處是否緊密



4. 吸入前 先呼 一口氣



5. 將吸嘴 含 於兩唇間，按壓一次吸入器，同時慢慢持續 深吸氣 至少 5 秒（請盡量於 按壓時同時吸氣 以確保藥效）



6. 然後 閉氣 5-10 秒，再慢慢吐氣



閉氣

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 如何清潔？

- 至少一星期清理吸入器一次。不要將金屬罐自塑膠外殼中取出，以乾布、面紙，或棉布將吸嘴與塑膠外殼擦拭乾淨即可。吸入器輔助器可使用清水洗淨並自然風乾。

■ 注意事項

1. 請在每次使用完後漱口，漱口能有效降低聲音嘶啞及鵝口瘡等副作用的發生。
2. 若需吸入第二個劑量時，請在第一次吸入動作完成後隔 1-2 分鐘，再吸入下個劑量。
3. 避免將吸入器置於溫度過高的地方（如日曬處）
4. 金屬藥罐不可放入水中。
5. 本藥品共有 120 個劑量，當劑量視窗顯示“020”時，就應考慮更換成新的吸入劑；當劑量視窗顯示“000”時，就一定要更換新的吸入劑。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 111.05
- PFS-7200-9006

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

