

# 藥品使用指導單

## 吸必擴<sup>®</sup>氣化噴霧劑 Symbicort<sup>®</sup>Rapihaler

### ■ 藥品成分名

Budensonide 160 mcg、Formoterol 4.5 mcg

### ■ 作用

- 減少氣管發炎並使支氣管擴張，用於治療氣喘、慢性阻塞性肺部疾病。

### ■ 用法



1. 每次使用前，先均勻振晃您的吸入器5秒鐘，接著輕輕擠壓蓋子兩邊並將蓋子打開。



2. 慢慢呼氣後把氣吐完，將白色吸嘴放入口中對準喉頭，確認嘴唇完整包覆吸嘴且瓶身保持直立。



3. 用手按壓吸入器頂部計數器使藥物噴出，同時透過嘴巴慢慢吸氣。
4. 持續吸氣至吸飽為止，並屏住呼吸10秒鐘。



5. 在開始吐氣之前，鬆開手指並將吸入器自嘴唇移開。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 注意事項

- 請在每次使用完後漱口，漱口能有效降低聲音嘶啞及鵝口瘡等副作用的發生。
- 若需吸入第二個劑量時，請在第一次吸入動作完成後隔30秒，再吸入下一個劑量(參照:用法 步驟1~5)。
- 因為所投予的粉末相當微量，您僅需依照前述方式使用，應可確保藥品已被吸入。
- 請勿冷藏或冷凍，若將藥品自鋁箔袋移出後，建議應儲存於室溫，不宜儲存於潮濕環境避免結霜，請避免陽光直射（不可高於50°C）。

## ■ 如何知道藥品存量？

- 當箭頭指示到黃色區域時，剩餘20次劑量，此時應準備再次取得新的藥物。
- 箭頭指示到紅色區域時，即應停止使用，雖然仍可按壓，但無法提供正確治療劑量。



## ■ 如何清潔？

- 至少一星期清理吸入器一次。請以乾淨的乾布擦拭吹嘴的內側與外側。
- 請勿試圖拆開吸入器。
- 藥罐不可放入水中。

參考資料：

1. Micromedex
2. 藥品仿單

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 111.05
- PFS-7200-9007

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮