

藥品使用指導單

鼻噴劑使用方法及注意事項

■ 藥品成分名與外觀

Nasonex 內舒拿鼻噴劑：Mometasone furoate / 綠色蓋子，白色瓶身

Besonin Aqua 碧適清 鼻腔定量噴液劑：Budesonide / 透明蓋子，白色瓶身

Nasacort AQ 拿塞可得 鼻用噴液劑：Triamcinolone / 紫色蓋子，白色瓶身

Dymista 鼻適暢鼻用噴霧劑：Azelastine/Fluticasone / 透明蓋子，棕色玻璃瓶身
(上述屬於類固醇類鼻噴劑)

Butaro 全妥噴鼻液：Butorphanol / 白色蓋子，棕色玻璃瓶身


Azetin 噴立停鼻用噴液劑：Azelastine / 透明蓋子，白色瓶身

■ 作用

類固醇類鼻噴劑用於治療過敏性鼻炎、鼻息肉等症狀

Butaro 全妥噴鼻液用於頑固性疼痛

Azetin 噴立停鼻用噴液劑用於緩解過敏症狀



■ 用法

(一) 第一次用藥

- 充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑數次(2-4次)，以確保噴出藥霧量均一。

(二) 平常用藥

1. 擤鼻(清理鼻腔)。
2. 搖動藥瓶、移開瓶蓋；若含安全扣環記得移除。
3. 將噴頭放入一側鼻孔中，並以手指按壓另一側鼻孔。
4. 請將噴頭對準鼻翼，用手按壓噴瓶，使之噴出固定劑量的氣霧。
5. 用鼻輕輕呼吸；如須第二噴，請隔30秒，重複步驟3，噴入第二噴鼻噴劑。

(三) 用藥後

- 用乾淨的紙巾或手帕將鼻噴劑噴嘴擦拭乾淨，蓋回蓋子。
- 用藥後10-15分鐘內盡量避免擤鼻涕。



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 注意事項

- 噴頭部位用衛生紙擦乾淨即可，不需用水清洗。
- 藥品不需冷藏，除非藥袋上有特別指示。
- 藥品變色不可使用。

■ 忘記用藥怎麼辦？

- 若您發現忘了用藥時，請盡速使用。
- 若已經很接近下一次用藥時間，請跳過這一次，到下次用藥時間再用當次的藥。
- 切記不可一次用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見副作用如：頭痛、鼻出血、嗜睡、噁心...等，若上述副作用加劇且無法緩解已造成您的困擾，請提前回診並告知醫師。
- 鼻用噴液劑給藥後可能會察覺苦味或有噁心想吐情況，造成原因可能為使用時頭部過於向後傾斜，建議將頭部稍向前傾使用再觀察是否改善。

■ 保存方法

- 藥品不需冷藏，除非藥袋上有特別指示。
- 瓶蓋要緊閉，儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.05
- PFS-7200-9016

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

