

藥品使用指導單

消炎止痛貼布使用方法及注意事項

■ 藥品成分名

Flurbi PAP 菲比藥膠布：Flurbiprofen

■ 藥品外觀

藍白包裝，白色貼布

■ 作用

經皮下吸收的止痛消炎貼布，用於緩解關節炎、肌腱炎等疼痛症狀。

■ 用法

1. 使用前可用清水清潔欲貼部位之皮膚(勿貼於傷口處)，待完全乾燥後再貼。
2. 使用時，請先撕去塑膠膜，把貼布貼在皮膚上，並用手掌緊壓 10 秒，確保整片貼布完全與皮膚接觸，或使用輔助膠帶或固定布固定以確保貼牢。
3. 每天使用最多 8 小時，以減少皮膚的不適。
4. 可至門診藥局藥物諮詢櫃檯領取背膠，以利固定。

■ 注意事項

1. 每片可持續作用 6-8 小時，貼布與皮膚接觸時間勿超過 8 小時，以免發生接觸性皮膚過敏、紅疹。
2. 因為此類劑型多半添加有引赤劑（發熱、清涼），盡量不要在此期間洗澡，以免刺激皮膚。
3. 請勿使用於下列部位：(1)眼睛四周，黏膜處 (2)濕疹、癢疹、傷口等部位。
4. 慢性病或重症者，一日換貼 2-3 次，可切割成適當大小。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：輕微搔癢。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：若病情持續或更嚴重、使用後皮膚腫脹搔癢或燒灼感時。
- 貼布含有非類固醇類消炎止痛成分，如有肝腎功能不全或過敏病史者，請務必依照醫師或藥師指示使用。

■ 保存方法

- 藥品不需冷藏，除非藥袋上有特別指示。
- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.05
- PFS-7200-9017

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

