

麻醉止痛貼片劑衛教單

吩坦尼穿皮貼片劑 Fentanyl Transdermal Patch

■ 藥品成份名

Fentanyl 12.5 mcg、25 mcg、50 mcg

■ 藥品外觀

透明貼片，含有藥品於貼片基質中。

■ 作用

強效、經皮下吸收的止痛貼片，用於需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。

■ 使用部位

1. 貼片應貼於上身軀幹（前胸、後背）或上臂、大腿等毛髮較少的部位，對年紀較小的兒童而言，上背部為較理想的部位。
2. 貼黏部位須完全乾燥。
 - 毛髮過長者應儘可能以剪刀剪短，但勿採剃刀刮除方式。
 - 貼黏部位須避開傷口、發紅或放射線治療部位。
3. 若需清洗：應以清水清洗，勿使用肥皂或其他清潔用品。
4. 更換貼片時，黏貼位置須更換。
5. 貼片不可剪裁使用。

■ 使用方法

1. 撕開貼片包裝及貼片黏貼層。



2. 將貼片貼於適當部位，以手掌緊壓 30 秒，使貼片完全平貼於皮膚上，尤其是貼片邊緣位置，或使用輔助膠帶，確保貼牢。



3. 以清水洗手，勿使用肥皂或其他清潔用品。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 新舊片替換方法

1. 舊片使用滿 72 小時後，將舊片撕下，於不同的適合部位貼上新片。同一位置皮膚建議相隔數日後再重複貼。
2. 用過之貼片，膠面對折黏貼後，放回原包裝袋，連同使用記錄單繳回藥局。

■ 其他注意事項

1. 每片可持續作用 72 小時，此期間可洗澡但建議淋浴，請避免泡熱水澡、大力搓該處或將貼片直接接觸熱源（熱水袋、電毯）以免貼片脫落。
2. 使用期間若發燒，吸收可能增加，須特別注意副作用的發生。
3. 止痛效果應在使用後 24 小時再進行評估，因為此貼片劑型為逐步釋放藥物，會造成藥效延遲，因此，
 - 如欲停用貼片，改用其他鴉片類止痛劑時，必須以低劑量的漸進方式慢慢增加，因為貼片移除後，藥物血中濃度經 17 小時後才下降 50%。
 - 原使用其他鴉片類止痛劑而轉換為貼片之患者，原止痛劑應逐步停藥，以免貼片療效未發揮，導致疼痛控制效果不佳。
3. 如有突發性疼痛，再加貼片不會立刻止痛，應依醫師指示服用其他需要時服用的止痛藥。
4. 可能造成步態不穩、警覺性變差，行走需小心且避免開車或操作機械。

■ 可能的副作用

1. 每種藥都有副作用，也不是每一個人都可能有些副作用。常見副作用如：便秘、呼吸減慢、噁心、嘔吐、便秘、意識不清、鎮靜和嗜睡。
2. 以上副作用若情況嚴重或讓您困擾，請立刻與您的醫療人員聯絡。
3. 若有嚴重過敏反應、無法呼吸、肌肉痙攣、持續胸痛及心跳不規則應立即就診。

■ 忘記貼/換藥時之處置

1. 當您想起時，立刻撕掉舊貼片，貼上新貼片。
2. 請勿使用雙倍劑量。

■ 藥品儲存處置

1. 置於未開封之原包裝內，貯於 25°C 以下。
2. 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.05

PFS-7200-9018

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

