

藥品使用指導單

樂得美乳膏 Aldara® 使用方法及注意事項

■ 藥品成分名


Imiquimod

■ 作用

治療皮膚上病毒感染所造成的疣

■ 用法


1. 臨睡前，請將雙手洗淨，然後拆開包裝袋，將「樂得美」乳膏擠於手指頭上。



2. 將乳膏薄塗於潔淨而乾爽之疣患表面，輕按輕摩，直至乳膏完全滲透。



3. 完成後，請把剩餘的乳膏包裝袋一併丟棄，勿讓兒童接觸。請以溫水和肥皂清洗雙手。



4. 在塗抹乳膏後六至十小時內，請勿洗澡。



5. 六至十小時後，應以性質溫和的肥皂和清水潔淨患處。



■ 注意事項

- 限皮膚外用塗抹，一般使用次數為每週三天(週一, 三, 五或二, 四, 六)。
- 塗藥前後應該要洗手，避免眼睛接觸到殘餘藥品。
- 需持續使用，直到疣體完全清除，用藥最多不超過16周。用藥後局部有輕度紅斑者，可不必停藥而持續使用；如患者感到全身不適或出現較為明顯的局部皮膚反應時，可停用幾天，待反應減輕後再繼續用藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

- 用藥後應避免性接觸，如需性接觸請務必將乳膏洗除。
- 塗抹乳膏後，請勿以繃帶或其他敷料覆蓋疣患。
- 可能影響保險套或子宮帽之避孕效果，如需使用這些避孕用品，請務必將乳膏洗除後再使用。
- 含有免疫調節劑成分，如有計畫生育、懷孕、免疫不全患者、或曾使用過本品治療皮膚疣之患者，請務必依照醫師或藥師指示使用。

■ 忘記用藥怎麼辦？

- 若您發現忘了用藥時，請盡速使用。
- 切記不可一次用雙倍的藥量。

■ 保存方法

- 藥品不需冷藏，除非藥袋上有特別指示。
- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.05
- PFS-7200-9019

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

