

藥品使用指導單

昂帝博®吸入膠囊 Ultibro®Breezhaler


■ 藥品成分名

Indacaterol 110 mcg, Glycopyrronium 50mcg

■ 作用

可使支氣管擴張，達到緩解喘、咳、呼吸困難之效果，用於治療慢性阻塞性肺疾病。

■ 用法




1. 拔開帽蓋，握住吸入器的底座，以傾斜掰開口含器的方式，完全打開吸入器（圖一、二）
2. 將膠囊從鋁箔片取出，放置於吸入器中央凹槽內。（圖三、四、五）
3. 蓋上吸入器並聽到喀擦聲。（圖六）
4. 吸入器向上，將兩邊按鈕同時壓到底後放開，即可刺破膠囊。請務必在刺破後放開兩側按鈕，勿持續按壓。（圖七、八）
5. 吐氣後，將吸嘴含於兩唇間，確保沒有縫隙。穩定吸入藥品至少五秒鐘，您會聽見呼呼的聲音。接著閉氣五到十秒，接著慢慢用鼻子呼氣。（圖九、十）

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮



6. 若您無法吸藥至少五秒，可分一至兩次吸入，大多數人在吸一至兩次後就能吸完藥品。（圖十一、十二）
7. 檢查膠囊內是否有殘留藥物，若有殘留，蓋上吸入器重複吸的動作。
8. 打開吸入器，倒出空膠囊並丟棄。（圖十三）

■ 注意事項

1. 請在每次使用完後檢查膠囊，確保膠囊內藥粉是否有吸完，膠囊內沒有殘留藥物才代表藥量都有確實吸入。若仍有殘留藥物，請同樣以吸藥的動作再做幾次，確認有聽到呼呼聲，吸的力道才有足夠。
2. 請勿冷藏或冷凍，建議儲存於室溫，不宜儲存於潮濕環境，且膠囊應存放在鋁箔片中，只有在使用前才立即取出，請勿將膠囊存放在吸入器中。
3. 不可吞服Ultibro Breezhaler膠囊，僅可使用於Ultibro Breezhaler吸入器。

■ 忘記使用藥品怎麼辦？

應儘速在同一天內使用藥品，同一天內請勿使用超過一次的劑量。

■ 如何清潔？

至少一星期清理吸入器一次。請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吹嘴即可，且不須以吹風機吹乾。

參考資料：

- 1. Micromedex
- 2. 藥品仿單
- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130，8132
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.05
- PFS-7200-9026

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮