

專案進口破傷風疫苗

Adsorbed Tetanus Vaccine 0.5 mL/amp

接種須知

■ 接種目的

預防破傷風。破傷風的致病原為破傷風桿菌。破傷風桿菌芽胞進入人體之方式，通常是經由受土壤、塵土或動物及人類糞便污染之穿刺傷口而入，另外也有可能透過撕裂傷、燒傷及一般傷口甚或由注射受污染之藥物而引起。壞死組織有利此種厭氣性破傷風桿菌增殖。最常見之臨床初症狀為腹部僵硬或肌肉痙攣，典型症狀為「角弓反張」及面部表情出現「痙笑」的特徵，伴隨強烈肌肉收縮疼痛。

■ 接種方法

肌肉注射，一般注射於高位上臂肌肉(三角肌)。本品嚴禁血管內注射。

基礎免疫：基礎免疫一共需接種三次。第一和第二次接種，每次劑量 0.5 mL，間隔 4-6 周。6-12 個月後進行第三次接種，劑量 0.5 mL。

追加免疫：每隔五至十年接種一次破傷風類毒素疫苗，每次劑量 0.5 mL。

■ 可能導致之副作用與危險

1. 發燒、畏寒、頭痛、倦怠感等，通常在2-3天內緩解。
2. 注射部位的紅、腫、熱、痛及鄰近部位與肢體的不適。

■ 預期治療效果

預防破傷風的方法就是按時接種破傷風疫苗。

■ 藥品資訊

Adsorbed Tetanus Vaccine, 0.5 mL/amp

此疫苗為印度公司SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.製造，由喜美德生醫科技股份有限公司經衛生福利部核准專案進口之產品，並已經食品藥物管理署檢驗合格封緘使用。

★ 本藥品未領有衛福部核發藥品許可證，不適用「藥害救濟法」。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.05

■ PFS-7200-9033

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮