

藥品使用指導單

可易適泡沫液 Vimax Foaming Solution

■ 藥品成份名

Clobetasol propionate

■ 藥品外觀



■ 作用


為類固醇消炎止癢藥，可治療牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

■ 用法用量

- 每日1-2次，輕擦於患部。
- 情況改善後即應停止用藥。治療超過四周若未複診則應停止治療。
- 請遵守醫師指示用藥。

■ 使用步驟

- 搖勻：使用前請先握緊瓶身搖動數次，使裡面的液體及氣體充分混合。
- 壓出：使用時請握住鋁罐，垂直倒立90度，按下噴嘴即可順利擠出泡沫慕斯。擠出適量泡沫於瓶蓋內，不要直接噴在手上或身體部位，因體溫會讓泡沫溶解成水狀。
- 塗抹：以手指取適量泡沫塗於患部並按摩
- 乾燥：塗抹完請清洗雙手，未用完泡沫建議丟棄，患部不須再沖洗。



- 下列錯誤方式會讓瓶內氣體外洩，使用一段時間後就無法擠出慕斯。



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 注意事項

- 儘可能避免長期持續治療，尤其是嬰兒及孩童。若使用於孩童，則建議應每周複診。
- 塗抹本劑於眼皮時應小心，避免讓藥物進入眼睛以免可能造成青光眼。
- 封閉包紮會造成溫濕的情況，而促使產生細菌感染。因此包紮前必須將皮膚清洗乾淨。
- 建議孕婦不得大量或長期使用本劑，使用前請先詢問醫師或藥師。
- 若發生過敏或其他不適症狀請停用藥品並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 可能的副作用

- 長期大量使用於廣泛部位會造成全身性的吸收，產生腎上腺皮質機能亢進進而影響內分泌系統平衡。尤其是使用在嬰兒、孩童、及封閉包紮情況。
- 長期密集使用會造成皮膚的局部萎縮性變化，如皮膚變薄、產生皺紋及表皮血管的擴張。

■ 藥品儲存處置

- 貯於25°C以下。
- 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.05

PFS-7200-9040

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮