

# 藥品使用指導單張

## 肺昇朗注®注射劑 (Fasenra® 30 mg/Syri.)

### ■ 藥品成份名

Benralizumab

### ■ 藥品外觀

預填式注射器，含透明至半透明，無色至黃色的溶液



### ■ 適應症


- 適用於嗜酸性白血球表現型的嚴重氣喘成人病人，做為附加維持治療。
- 不適用於治療其他嗜酸性白血球疾病。
- 不適用於緩解急性支氣管痙攣或氣喘重積狀態。

### ■ 用法用量

- 前3劑為每4週一次皮下注射30毫克，之後每8週一次皮下注射30毫克。
- 用於長期治療時至少每年應依據疾病嚴重度、氣喘惡化控制和血中嗜酸性球濃度評估是否繼續接受治療。


### ■ 注射部位

- 可選擇腹部(距肚臍5公分之外的區域)、上臂(外側中段)或大腿(前外側上1/3處)的皮下。
- 每次注射部位建議輪替，避免同一個部位重複注射



### ■ 保存方法

- 置於冰箱冷藏(2°C至8°C)。
- 在室溫25°C以下最多可保存14天。
- 從冰箱中取出後，必須在14天內使用完畢，若未用完應丟棄。
- 請將預填式注射器/自動注射器置於原包裝內保存，避免光線照射。
- 不可冷凍。應避免受熱。
- 請勿搖晃，若凍結請勿使用。




此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。




以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 使用說明


1. 施用之前，請先將FASENRA 置於室溫中回溫，通常需要30分鐘。
2. 請於24小時內使用完畢，使用後丟棄於尖銳物品收集盒內。
3. 請握住注射器本體，從托盤中取出預填式注射器。檢查注射器有效期限。
4. 目視檢查是否出現異常微粒物質或變色，應為透明無色至微黃，可能含有半透明或白色至乳白色顆粒。若出現液體渾濁、變色或有大顆粒或異物顆粒，請勿使用。注射器可能含有小氣泡，這是正常現象，施用前請勿排出氣泡。
5. 洗淨雙手，並用酒精棉片擦拭欲施打的部位。




要注射之前再取下針套，握住注射器本體，直接拿掉針套。



輕輕捏起建注射部位皮膚，刺入針頭。



將柱塞推到底，注入所有藥劑，直到柱塞頭完全位於針頭安全裝置啟動夾中間。這是啟動針頭安全裝置的心要步驟。



注射後請持續按住柱塞頭，同時將針頭從皮膚拔出。鬆開柱塞頭安全裝置將自動蓋住針頭；請勿將注射器針套重新蓋上。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



## ■ 可能的副作用

- 最常見的不良反應為頭痛和咽喉炎。
- 過敏反應：蕁麻疹、丘疹性蕁麻疹、紅疹等。
- 注射部位皮膚不適(疼痛、紅斑、搔癢、丘疹)。
- 若注射後有以上症狀發生，或加重且持續數天，請告知醫(藥)師。

## ■ 注意事項

- 開始使用後如果氣喘症狀仍控制不良或惡化，則應就醫。
- 開始使用FASENRA治療後，不宜驟然停用皮質類固醇。在合適的情況下，若要減少皮質類固醇劑量，應在醫師監督下逐步調整。
- 每次注射都應更換注射部位。
- 請勿注射在皮膚觸痛、瘀傷、紅斑或變硬的部位。
- 若使用前藥品外觀破損或遭破壞，請勿使用。
- 若您計畫懷孕、已懷孕或正在授乳，請主動告知醫(藥)師。
- 若您有服用其他藥品或保健食品，請主動告知醫(藥)師。
- 勿與其他藥品混合使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130，8132

制訂單位/日期：藥劑部/112.01

PFS-7200-9043

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮