# 藥品使用指導單
# 艾能舒®吸入膠囊 Enerzair®Breezhaler

## ■ 藥品成分名

Indacaterol 150mcg /Glycopyrronium 50mcg /Mometasone furoate 160mcg

## ■ 作用

局部作用於呼吸道，產生支氣管擴張作用，並減緩肺部發炎反應，做為氣喘維持治療。

## ■ 用法

**(1)置入　(2)刺破並放開　(3)深吸　(4)檢視膠囊**

1. 拔開帽蓋，握住吸入器的底座，以傾斜掰開口含器的方式，完全打開吸入器。（1a、1b）

2. 將膠囊從鋁箔片取出，放置於吸入器中央凹槽內。（1c、1d）
<u>切勿將膠囊壓出鋁箔。不可吞服膠囊。</u>

3. 蓋上吸入器並聽到喀擦聲。（1e）
吸入器向上，將兩邊按鈕同時壓到底後放開，即可刺破膠囊。（2a、2b）
<u>只可刺破膠囊一次。</u>

4. 將氣完全吐出。（3a）
<u>不可對著吸入器吐氣。</u>

5. 將吸入口放入口中，並緊閉雙唇。快速、盡可能深深吸氣。吸藥時，您會聽見呼呼的聲音，並會嚐到藥物味。（3b）
   此時不要按壓兩側按鈕。

6. 屏住呼吸，閉氣最多五秒。（3c）
   用藥後以清水漱口並吐出。

7. 打開吸藥器，檢查膠囊內是否有粉末殘留。若膠囊內有粉末，蓋上吸入器重複吸的動作。

8. 打開吸入器，倒出空膠囊並丟棄。關上吸入器，並蓋上帽蓋。

## ■ 注意事項

1. 膠囊必須儲存在包裝中，以防潮和光線照射，並且只能在使用前才取出。
2. 請勿將膠囊壓出鋁箔之方式取出。
3. 不可吞服膠囊。
4. 只須按壓一次兩側按鈕。
5. 請勿對著口含器吐氣。
6. 經由口含器吸氣時，請勿按壓兩側按鈕。
7. 請勿以潮濕的手拿取膠囊。

## ■ 忘記使用藥品怎麼辦？

應盡速在同一天內使用藥品，同一天內請勿使用超過一次的劑量。

## ■ 如何清潔？

以乾淨、乾燥的無塵布擦拭口含器內外，以去除任何的殘留粉末。
吸入器應保持乾燥。絕對不可以水清洗吸入器。

參考資料：
- 1. Micromedex
- 2. 藥品仿單

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130，8132
- 制訂單位 / 日期：藥劑部/ 112.07
- PFS-7200-9045

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮