

藥品使用指導單

一般口服抗生素懸浮液之使用方法

■ 院內品項

- Amolin® 50mg/mL，60mL/bot
- Augmentin® 457mg/5ml
- Ulexin® 25mg/ml，60ml/bot



■ 配製方法

1. 配製抗生素懸浮液前請先將藥瓶內之粉粒徹底搖鬆。
2. 藥瓶內先加入約刻度一半高度之冷開水，並充分搖勻至無結塊。
3. 再次加入冷開水於藥瓶內，稀釋至藥瓶上的刻度處。
4. 加水配製後之抗生素懸浮液，請置於冰箱 2~8 °C 冷藏。
5. 每次服藥前請先徹底搖勻懸浮液再使用。

■ 忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 注意事項

1. 懸浮液配製後，請冷藏於冰箱內，並於7日內服用完，若藥品超過保存期限請丟棄。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 112.02
- PFS-7200-8000

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

