

藥品使用指導單

優閒®內服液劑(Keppra Oral Sol'n)

■ 藥品成分名

Levetiracetam 100mg/mL, 300 mL/bot

■ 作用

控制癲癇或痙攣

■ 用法用量

1. 本藥品可與水併服，飯前或飯後服用均可，盒內附有具有刻度之量器。建議每日劑量平均分早、晚兩次使用。
2. 建議用量：
醫師會根據目前的治療組合、治療效果與病人對藥物的耐受性做個人化的調整，請按醫囑服藥，勿自行增減藥量或任意停藥。

成人 和 十六歲 以上青年	單一 治療	每日兩次每次250毫克開始，依其臨床情況調整， 建議每日最高劑量為3000毫克(分兩次使用)
	輔助 療法	每日兩次每次500毫克開始，依其臨床情況調整， 建議每日最高劑量為3000毫克(分兩次使用)
兒童 和 五十公斤 以下青年	依 體重 計算	每日兩次每次每公斤10毫克，依其臨床情況調整， 建議最高劑量為每日兩次，每次每公斤30毫克

3. 需改變劑量時，請依您的處方醫師評估為主。建議以階段性方式，每二至四星期增或減：

成人	每日1000毫克(當日分兩次，每次增/減500毫克)
兒童	每公斤20毫克(當日分兩次，每次增/減每公斤10毫克)

■ 注意事項

- 藥品可能造成嗜睡或注意力減低，若需要持續開車或操作複雜機械時，其能力需定期由醫師作評估。
- 本藥品會排泄至乳汁中，有可能會使嬰兒產生不良反應，因此使用本藥品期間不建議授乳。
- 若出現自殺行為及念頭時，請立即與您的醫療人員聯繫。
- 對本藥中任何成分過敏，或對Pyrrolidone 衍生物過敏者，應避免使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

每一個藥都有副作用，但不是每一個人都可能有些副作用。

常見副作用如：嗜睡、無力感、頭痛、消化不良、口乾、肌肉酸痛。

如果開始服用後出現任何讓您困擾的症狀，請立即停用並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

1. 開封後室溫可保存2個月。
2. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
3. 避免放在孩童可以取得的場所。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.05
- PFS-7200-8003

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮