

藥品使用指導單

派卡登內服液劑 (Piracetam Oral Sol'n)

■ 藥品成分名

Piracetam

■ 作用

對腦血管障礙及老化所引起的智力障礙可能有效、皮質性陣發性抽搐之輔助療法。

■ 用法用量

1. 治療腦血管障礙及老化引起的智力障礙：
常用劑量為每日1.2公克至2.4公克，最大建議劑量為每日4.8公克。
2. 治療皮質性陣發性抽搐：由醫師視病患的個別情況而酌量給與。
最大建議劑量為每日24公克，分二至三次使用。
3. 一般建議治療療程為六個月。
4. 如需調降藥品劑量或停止治療時，一般建議以每兩日降低1.2公克的方式緩慢漸減，以避免突然復發，但請依您的處方醫師評估為主。

■ 注意事項

- 開始以本藥品治療後，必須持續服用直到症狀解除。
- 本藥品可能會影響血小板的凝集，因此對於有止血考量的患者(特別是動手術或嚴重出血)需特別注意，請先告知您的處方醫師。
- 因使用本藥品期間不建議授乳，準備懷孕、已懷孕或授乳者，請先告訴您的處方醫師。
- 請注意使用本藥可能影響開車及操作機械的能力。
- 對本藥中任何成分過敏，應避免使用。
- 腦內出血或末期腎疾病人，不建議使用本藥。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

每一個藥都有副作用，但不是每一個人都有可能有些副作用。請勿驚慌，常見副作用如：眩暈、過敏、頭痛、腹痛。

如果開始服用後仍出現任何讓您困擾的症狀，請立即停用並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

1. 開封後室溫可保存1個月。
2. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
3. 避免放在孩童可以取得的場所。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/111.05

■ PFS-7200-8004

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮