

# 藥品使用指導單

## 賽力多<sup>®</sup> 內服液劑 (Seridol<sup>®</sup>)

### ■ 藥品成分名

Risperidone 1mg/mL, 30mL/bot

### ■ 作用

治療思覺失調症之相關症狀及疾病引起之躁動或精神病症狀。

### ■ 用法用量

- 1毫升藥劑等同於1毫克劑量。
- 成人每日一次或二次，須從每日2 ml 開始給藥。劑量可在第二天增至4 ml。其後劑量可維持不變或必要時視個別情況予以調整，最佳劑量為每日4-6 mg。
- 兒童(13-17歲)建議起始劑量為每天一次，每次0.5 ml，可在早上或下午使用。必要時，劑量可依個人耐受度以每天0.5 ml或每天1 ml的增加量增加至建議劑量每天3 ml。
- 老年人建議起始劑量為每天兩次每次0.5 ml。劑量可視個別情況以每天兩次每次0.5 ml 的增加量增至每天兩次每次1-2 ml。

### ■ 注意事項

- 調整劑量時需緩慢調整，不可突然停藥或自行增加劑量。
- 腎臟或肝臟功能不全病人須進行劑量調整並以較慢的速度調整劑量。
- 若有服用其他藥物尤其是精神病或癲癇藥物時須告知醫生。
- 如有懷孕或正在哺乳的婦女需告知醫生。
- 吃藥後如需開車或操作精密儀器時需注意。
- 勿與茶併服。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一個藥都有副作用，但不是每一個人都可能有這些副作用。
- 較輕微副作用：皮膚紅疹、噁心、便秘、口乾、體重增加、暈眩。
- 需注意之副作用：心律不整、乳房脹痛、泌乳、癲癇。
- 若服藥後出現任何讓您困擾的症狀時，請盡速聯絡您的醫療人員諮詢！

## ■ 保存方法

1. 請密封儲存於25°C以下及避免陽光直射，不須冷藏。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 111.05
- PFS-7200-8006

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

