

藥品使用指導單

除癲達[®] 口服懸浮液 (Trileptal[®])

■ 藥品成分名

Oxcarbazepine 60mg/mL, 100ml/bot

■ 作用

治療局部癲癇發作之單一或輔助療法

■ 用法用量

■ 成人及老年人：

單一治療	起始劑量300mg一天兩次，以每3天調升300mg的速度直到達每日1200mg或2400 mg
------	---

輔助療法	起始劑量300mg一天兩次，以每週調升600 mg的速度直到達每日1200mg
------	---

■ 兒童：

單一治療	20kg	每日 600-900 mg
------	------	---------------

	25 -30 kg	每日 900-1200 mg
--	-----------	----------------

	35-40 kg	每日 900-1500 mg
--	----------	----------------

	45 kg	每日 1500 mg
--	-------	------------

	50-55 kg	每日 1200-1800 mg
--	----------	-----------------

	60 -70 kg	每日 1200-2100 mg
--	-----------	-----------------

輔助療法	每日8-10mg/kg分成兩次給藥，最大劑量每日600mg	
------	-------------------------------	--

■ 給藥方式

- 懸浮液服用前請先搖均勻再使用。
- 將已開啟的瓶子垂直向上置於桌面上，並將塑膠接合器儘可能地用力往瓶子頸部推入。抽取時須將注射筒與接合器接合後，將瓶口朝下抽出所需體積並將氣泡排至瓶內，抽出醫師所處方的劑量後，小心地將瓶身轉為向上，將注射筒輕輕扭轉取出。塑膠接合器必須一直保持在瓶內。如需使用超過10 ml，需抽取兩次。
- 懸浮液可直接自口服注射器吞服或可以先與一小杯水混合後再服用。
- 在每次服用後，藥瓶應該緊閉，且以乾燥、清潔的紙巾擦拭注射器外部。
- 本藥品可空腹或與食物併服。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 注意事項

- 調整劑量時需緩慢調整，不可突然停藥或自行增加劑量。
- 腎臟或肝臟功能不全病人須調整劑量。
- 若有服用其他藥物(特別是抗癲癇藥物)時須告知醫生。
- 如有懷孕或正在哺乳的婦女禁止使用。
- 吃藥後如需開車或操作精密儀器時需注意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

每一個藥都有副作用，但不是每一個人都可能有這些副作用。

較輕微之副作用：困倦想睡、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、疲勞、複視。

需注意之副作用：不正常出血、尿液顏色變深、精神混亂、嚴重皮膚過敏反應(如：蕁麻疹、紅斑等)。

■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 111.05
- PFS-7200-8007

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮