

藥品使用指導單

高克痢[®]懸乳液(Pecolin[®] 120 mL)

■ 藥品成分名

Kaolin 200 mg/ml , Pectin 10 mg/ml

■ 藥品外觀

塑膠瓶裝；乳白色液劑。

■ 作用

緩解輕中度急性腹瀉

■ 用法

- 服用前請先搖勻。
- 每次間隔至少4小時，1天不得超過4次
- 建議與其他藥物間隔至少3小時。

■ 注意事項

- 若您已知對此藥物過敏，請務必告知醫師。
- 若您的腹瀉伴隨著發燒或有血便的情形，請勿使用本止瀉劑，並請盡速就醫。
- 服藥後2-3天後若腹瀉狀況無改善，請再回診就醫。
- 大量或長期服用可能會造成便秘，當已無腹瀉情形即可停藥。
- 懷孕或計畫懷孕、哺乳者，請先告知您的醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

1. 此藥較少見嚴重副作用。
2. 若您懷疑有此藥產生的不適副作用請立即回診。

■ 保存方法

1. 藥品未開封前效期為瓶身所標示之使用期限，開封後室溫可保存2星期。
2. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
3. 避免放在孩童可以取得的場所。
4. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.05
- PFS-7200-8009

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮