

藥品使用指導單

蓖麻子油® (Oleum Ricini)

■ 藥品成分名

Oleum Ricini

■ 藥品外觀

黃色黏稠性之液體

■ 作用

- 蓖麻子油®可增加腸蠕動與促進液體蓄積於大腸而產生緩瀉作用，達到緩解便秘的效果；亦可於手術或檢查前做為淨腸劑使用。
- 服用後2-6小時後，即見效。

■ 用法

- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 空腹服用並喝大量開水。

■ 注意事項

- 本藥不應長期使用，一旦排便順暢，即應停藥。
- 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
- 如廁時請小心以防跌倒、滑倒。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形請不用驚慌：腸道過度活動如：腹絞痛、腹痛、噁心、嘔吐等。
- 若上述症狀持續且有嚴重趨勢或有過敏反應，如虛弱、暈眩、心悸、劇烈絞痛、血便或肛門出血等，請立即停藥並就醫！

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄，開封後一般效期為三個月。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 預防藥物造成跌倒

- 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌倒，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。
- 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 112.02修
- PFS-7200-8010

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮