

藥品使用指導單

杜化[®]液 (Duphalac[®] Solution 667 mg/mL)

■ 藥品成分名

Lactulose

■ 藥品外觀

白色瓶裝，無色至黃褐色澄清黏稠液體

■ 作用

杜化[®]液可用於緩解慢性便秘、降低血中氨的濃度。

■ 用法

- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 治療劑量依個人情況而定，服用後 24 到 48 小時產生藥效。

■ 注意事項

- 假如您有糖尿病、懷孕、授乳或正在服用其他藥物，須先告知您的醫生。
- 便秘治療數天後沒有反應或再復發，應向醫師詢問。
- 因本藥含有乳糖，因此乳糖不耐症患者需小心使用。
- 於糖尿病患者，使用於治療便秘的劑量較低，通常應不會造成影響。但使用於肝昏迷的劑量較高，可能需要加以考量。
- 長期使用未經調整的劑量和濫用，可能會導致腹瀉和擾亂身體內電解質平衡。
- 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床時請注意攙扶以防跌倒，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：腹痛、噁心、食慾不振。
- 若腹絞痛持續嚴重且有不尋常之腹瀉/水瀉時，請立即停藥並就醫。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.07
- PFS-7200-8012

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

