

# 藥品使用指導單

## 滅菌靈懸液用粉劑 (Mycostatin®)

### ■ 藥品成分名

Nystatin 100,000 Unit/mL

### ■ 作用

滅菌寧®用於治療或預防由白色念珠菌所引起之口腔、皮膚及腸道感染等。

### ■ 泡製方法

1. 先將藥瓶內之粉粒徹底搖鬆後再打開瓶蓋，移除瓶口封膜。
2. 加入23毫升(23 c.c.)的冷開水後，旋緊瓶蓋並用力振搖均勻。
3. 每次使用前皆需振搖均勻，用所附之滴管或量杯量取需要之藥量，含於口中反覆漱之。
4. 泡製完成的懸液劑應於七日後丟棄。

### ■ 注意事項

- 本藥品口服後幾乎不被身體吸收，但是漱口完後需吞下或吐出懸液劑需由醫師依照您的症狀進行評估。
- 請依照指示使用藥物，本藥物不適用於全身性黴菌感染之治療。
- 即使在治療前幾天症狀得到緩解，仍應持續服用直到療程完成，不可自行停藥，以免引起症狀復發和抗藥性。
- 如出現刺激性症狀，請立即與您的醫療人員聯繫。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了用藥時，請盡速用藥。
- 若已經很接近下一次用藥時間，請跳過這一次，到下次用藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次使用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

每一種藥品都有副作用，但不是每一個人都有可能這些副作用。

滅菌寧®對所有年齡，包括虛弱的嬰兒，即便長期使用都具有良好的耐受性。但大量口服劑量(一次超過50毫升)偶爾會出現腹瀉、腸胃不適、噁心和嘔吐。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-8014

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮