

藥品使用指導單

克流感膠囊 (Tamiflu 75mg) 泡製口服懸浮液方法

克流感膠囊為一對抗流行性感冒病毒藥物，為避免藥品磨粉、分包造成的汙染，讓您服用更精確的劑量，克流感膠囊若不是整顆吞服時，請依照以下說明與冷開水混製成適量的口服懸浮液使用。

■ 配製方法

1. 將所有克流感膠囊自鋁箔中取出
2. 剝開所有膠囊，將其藥粉全部倒入空藥瓶，並丟棄膠囊外殼
3. 加入所需量之冷開水並緩慢振搖瓶身，直至藥瓶上之總體積為止
4. 蓋上瓶蓋，用力振搖均勻
5. 量杯量取所需藥量服用



勾選	總顆數	調配總體積	使用方式
<input type="checkbox"/>	4顆	20ml	每日兩次，早晚飯後服用2ml x 5天
<input type="checkbox"/>	6顆	30ml	每日兩次，早晚飯後服用3ml x 5天
<input type="checkbox"/>	8顆	40ml	每日兩次，早晚飯後服用4ml x 5天

■ 注意事項

1. 請使用本院所提供之空瓶配製，配製後懸浮液濃度為15mg/ml。
2. 配製後懸浮液易沉澱，使用前請充分搖勻後，立即以藥杯量取所需用量服用
3. 保存方式：室溫下可放置5天，請在配製後按時間服用完畢。
4. 必要時，可在每次服用前量取好的藥杯中加入果糖調味。
5. 可能的副作用：皮膚癢、紅疹、腹瀉、腹痛、類流感症狀等，如服藥後出現另您困擾的症狀且越趨嚴重，請盡速聯絡醫療人員或就醫處理。

■ 忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.09, 111.10 修
- PFS-7200-8015

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

