

藥品使用指導單

胃明朗®膜衣錠 (Promeran®3.84mg)

■ 藥品成分名

Metoclopramide

■ 藥品外觀

白色圓形錠劑，標記：[S]

■ 作用

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

■ 用法

- 請遵照醫師指示服藥。
- 建議於飯前半小時服用效果較好。

■ 注意事項

- 對Metoclopramide或本藥品賦形劑過敏者，疑似有嗜鉻性細胞瘤之患者，請勿使用此藥。
- 若患有癲癇、帕金森氏症、胃腸道阻塞、穿孔、出血疾病、腎上腺瘤等，使用相關治療用藥，請先告知您的醫師。
- 懷孕或計畫懷孕、哺乳、有高血壓、心、肝、腎、精神方面等疾病，及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料，酒精易增加藥品昏睡的副作用。
- 本藥品可能會讓您覺得頭暈、嗜睡，在未確定此藥對您有何影響之前如需開車或操作危險機械，請務必特別注意。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
偶有胃的緊張性增加，腹痛，便秘，腹瀉，疲倦感	若症狀持續或嚴重時，請告知醫師
出現肌肉痙攣、僵硬、震顫、精神狀態改變、昏迷，或臉部、眼睛、舌頭、頸部、頭部、四肢不自主運動，吞嚥困難、心搏過速、發疹、浮腫等	請停藥並立即回診

■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫25°C以下乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 113.03
- PFS-7200-0023

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮