

藥品使用指導單

癲能停®膠囊 (Dilantin® 100 mg)

■ 藥品成分名

Phenytoin

■ 藥品外觀

鮮紅橙/白色，硬膠囊；大小：3 號；標記：[PARKE，DAVIS][P-D，100]

■ 作用

- 是一種抗痙攣藥，可用於治療：
 - 控制癲癇或痙攣。
 - 治療周邊神經病變引起的疼痛，如：偏頭痛、三叉神經痛。
 - 心肌收縮異常造成之心律不整。

■ 用法

- 癲能停®膠囊必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
- 請整粒吞服，建議與食物或牛奶併服以減少胃腸刺激。
- 制酸劑會影響本藥品的藥效，請在服藥後 1 小時再服用制酸劑。
- 管灌餵食的病人，請避免與食物一起以鼻胃管灌食，需間隔至少 2 小時。膠囊可打開直接以藥粉餵食，此藥易殘留於管壁上，建議灌完後以 10~30 c.c. 冷開水沖洗，避免藥粉黏附在管壁上。

■ 注意事項

- 對 Phenytoin、本藥品賦形劑或其他抗癲癇藥物過敏，請勿使用此藥。
- 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝病、腎臟病及正服用其他藥物者，請先告知醫師。
- 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
- 本藥品可能會造成頭暈，動作不協調、視線模糊、疲倦，在未確定此藥對您有何影響之前如需開車或操作危險機械，請務必特別注意。
- 若需進行手術、拔牙，或其他緊急治療，請告知醫師正服用此藥。
- 此藥品可能降低口服避孕藥的效果，請採用其他避孕方式。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
牙齦紅、腫、出血 (較易發生在年輕人)	做好口腔衛生(刷牙、使用牙線)、按摩牙齦、定期作口腔檢查，若症狀嚴重時請與醫師聯繫
噁心、嘔吐、便秘、胃痛	可隨餐服用或飲用大量水分，若症狀持續未改善，請與醫師聯繫
困倦、頭暈、頭痛、毛髮增生、失眠 味覺異常、體重減輕、吞嚥困難	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
動作不協調、意識混亂、言語不清、 視線模糊或複視、癲癇發作次數增加 肌肉抽搐、皮膚出現紫斑、不正常出血、 呼吸困難、胸痛	若發生這些副作用時，請立即停藥並 與醫師聯繫

■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.05
- PFS-7200-0026

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮