

藥品使用指導單

柔糖[®]錠 (Repaglinide[®] 1mg)

■ 藥品成分名

Repaglinide

■ 藥品外觀

淡黃、橢圓形、錠劑，標記：[CCP/C74]

■ 作用

用來治療第二型糖尿病患者（非胰島素依賴型），並藉由促進胰臟分泌胰島素、增加身體對胰島素的敏感度，使血糖維持在正常值。

■ 用法

- 請遵照醫生指示服藥，通常一天配合正餐服用。請於飯前 10-15 分鐘內服用，或服用後立即用餐。
- 若未用餐則不須服藥。
- 若多吃一餐(或少吃一餐)，請在飯前多服用一劑量(或少服用一劑量)之此藥物。

■ 注意事項

- 若您有以下情形，請告知您的醫（藥）師。
 - 孕婦、哺乳中婦女、有肝腎方面疾病者。
 - 若您有服用其它藥物（包括自行在藥房購買的）。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料。
- 對Repaglinide或本藥品賦形劑過敏者，請勿使用此藥
- 配合醫生指示控制飲食和適量運動將有助於您的健康。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 常見：腹部疼痛、腹瀉，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。

■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

■ 發生低血糖該怎麼辦？

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
 1. 血糖值小於70 mg/dl：應立即進食含15公克易吸收含有糖份的食品，如含糖飲料或果汁150毫升、3顆方糖、2包糖包、1大匙蜂蜜、2大匙葡萄乾或葡萄糖錠3顆等。
 2. 15分鐘後若症狀未改善，可再吃一次15公克易吸收含有糖份之食品（同上）；若低血糖症狀一直沒有改善，則應立刻送醫治療。
 3. 如症狀改善，但距離下一餐還有一小時以上，建議喝一杯(240毫升)牛奶或食用一份點心避免再度發生低血糖。若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
 4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。
 5. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.05
- PFS-7200-0028

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮