

藥品使用指導單

艾來[®]錠 (Allegra[®] 60mg)

■ 藥品成分名

Fexofenadine

■ 藥品外觀

淡紅橙，橢圓形，錠劑；大小：1.22 公分；標記：[06][特殊標記]

■ 作用

為第二代抗組織胺藥物。可緩解乾草熱、感冒、過敏性鼻炎、慢性自發性蕁麻疹等過敏症狀。

■ 用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有腎疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 本藥品可能會有嗜睡、頭痛的副作用，使用後應避免開車及操作機械等危險動作。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形請不用驚慌：嗜睡、疲倦、頭痛、背痛、失眠、心跳過速等。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：臉、唇或喉嚨水腫、原因不明的發燒、畏寒、心跳快速或不規則、呼吸困難或抽搐等，請立即停藥並就醫。

1. 此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 保存方法

- 儲存於室溫（20~25°C）乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 預防藥物造成跌倒

- 使用抗組織胺藥物可能造成嗜睡，或影響情緒、注意力、警覺心、活動力而易造成跌倒等意外。
- 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手及站穩踏階以防跌倒受傷。
- 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.05
- PFS-7200-0034

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮