藥品使用指導單 無鬱寧®膜衣錠 (Luvox® 50mg)

■藥品成分名

Fluvoxamine

■藥品外觀

白色,圓凸形,錠劑;大小:0.9公分;標記:[S][291]

■作用

調節情緒或治療強迫症

■用法

- 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。
- 建議在晚上服用。
- 將藥物與水吞服,請勿咬碎。

■注意事項

- 若您計畫(已)懷孕、哺乳,或者是有肝、腎、心臟疾病,應告知您的 醫生及藥師。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料。
- 服用藥物可能造成視力模糊、嗜睡,請避免操作機械及開車。
- 服用本藥治療期間,請小心行動,以避免發生跌倒意外造成危險。
- 請勿自行突然停藥,此藥需逐漸減量以避免發生戒斷反應。

■忘記服藥怎麼辦?

- 若您發現忘了服藥時,請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間,只需服用下次藥物,不可一次服用雙倍的藥量。

■可能的副作用

- 每一種藥都有副作用,若有以下情形,請您不用太過擔心:腸胃不適、 便秘、口乾、視力模糊、嗜睡。
- 當上述的症狀若持續且加重,請立即就醫。

■保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處,勿置於陽光直射處或車內,以免潮濕或高溫 造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料:

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話:(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期:藥劑部/113.05

■ PFS-7200-0035