

# 藥品使用指導單

## 安納柔®膜衣錠 (Anazo® 1mg)

### ■ 藥品成分名

Anastrozole

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分

### ■ 作用

為停經後婦女之乳癌輔助治療藥品，並預防復發。

### ■ 用法

- 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
- 一般為每天服用一錠，若有腸胃道不適，可與食物或牛奶併服。

### ■ 注意事項

- 懷孕或授乳婦女，有肝、腎、心臟疾病者，應事先告知您的醫師及藥師。
- 服藥期間可能會產生熱潮紅，穿著涼爽的衣服或待在涼爽的環境會有所幫助。
- 本藥品賦形劑中含有乳糖，若有乳糖不耐症的患者請事先告知您的醫師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



## ■ 可能的副作用

- 胃痛、噁心嘔吐、胸部疼痛，呼吸短促，手或腳發紅、發熱及腫脹，手腳麻或無力，頭暈、頭痛疲倦、虛弱、喉嚨痛、關節疼痛、陰道搔癢或有分泌物，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。

## ■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.05
- PFS-7200-0037

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮