

藥品使用指導單

寧痛[®]膜衣錠 (Linton[®] 10 mg)

■ 藥品成分名

Hyoscine Butylbromide

■ 藥品外觀

白色圓形膜衣錠，無刻痕

■ 作用

用於緩解平滑肌之痙攣，包含胃腸痙攣、膽道痙攣及尿路痙攣等。

■ 用法

- 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 若您曾對寧痛[®]膜衣錠成分過敏，或有青光眼、前列腺肥大、排尿困難、重症肌無力，請勿服用此藥。
- 若您計畫懷孕或已懷孕、哺乳、有肝、腎、心臟疾病、潰瘍性大腸炎、甲狀腺機能亢進、幽門狹窄等病史，應告知醫師。
- 若您同時有服用任何其他藥物，請告知醫師或藥師。
- 此藥物可能造成視力模糊，服藥期間應避免從事需精神集中或視力敏銳之工作，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人需特別注意。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：短暫性視力模糊、口乾、頭痛、心悸、尿液滯留、便秘。若上述的症狀持續且加重，請回診告知醫師。
- 若您在用藥後發生過敏(蕁麻疹、眼睛及嘴巴周圍腫脹或刺痛、皮膚搔癢、胸痛、喘、呼吸困難)，請立即就醫。

■ 保存方法

- 貯放於室溫25°C以下乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 114.05
- PFS-7200-0042

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮