

# 藥品使用指導單

## 律莎錠(Rakinson® 1 mg)

### ■ 藥品成分名

Rasagiline

### ■ 藥品外觀

白色、圓形、錠劑；大小：0.6公分；標記[R]

### ■ 作用

治療帕金森氏症

### ■ 用法

通常成人一天一次一錠，依個別狀況調整劑量，請依照醫囑服用。  
此藥可單獨服用或與食物一同服用。

### ■ 注意事項

- Rakinson® 可能與某些藥物產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品。若出現意識混亂、體溫高、血壓高、心跳加快、肌肉僵硬、痙攣、嚴重噁心嘔吐等症狀，請立即就醫。
- 若您有肝功能不全的問題，請事先告知醫師。
- 服藥期間應避免食用含有大量酪胺（tyramine）的食品（如：起士、乳酪、紅酒、酪梨、香腸、醃漬品），因為可能會導致嚴重高血壓。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 過敏、頭痛、暈眩、姿勢性低血壓、胃脹氣、肌肉骨骼疼痛、嗜睡、幻覺、意識混淆、食慾降低等。
- 如果開始服用律莎錠後，出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處，避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/113.06

■ PFS-7200-0049

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

